

# 肝得健注射劑 Lipodissolve Injection

衛署藥製字第 057953 號 (GMP G-11974)

**【性狀】** 每安瓿 (5ML) 含 Phospholipid Essential 250MG (天然多烯磷脂醯膽鹼，含有大量的不飽和脂肪酸，主要為亞油酸[約占 70%]、亞麻酸和油酸)。

本品為黃色澄清液體。

**【賦形劑】** Sodium deoxycholate、Benzyl alcohol、DL-Alpha tocopherol、Sodium chloride、Ethanol、Riboflavin sodium phosphates、Water for injection。

**【藥理作用】** 當患肝臟疾病時，肝臟的代謝活力受到嚴重損傷。多烯磷脂醯膽鹼可提供高劑量容易吸收利用的高能多烯磷脂醯膽鹼，這些多烯磷脂醯膽鹼在化學結構上與重要的內源性磷脂一致，而且在功能上優於後者。它們主要進入肝細胞，並以完整的分子與肝細胞膜及細胞器膜相結合，另外，這些磷脂分子尚可分泌入膽汁。

因此多烯磷脂醯膽鹼具有下列生理功能：

- 通過直接影響膜結構使受損的肝功能和酶活力恢復正常。
- 調節肝臟的能量平衡。
- 促進肝組織再生。
- 將中性脂肪和膽固醇轉化成容易代謝的形式。
- 穩定膽汁。

**【適應症】** 肝炎、肝硬化。

**【用法用量】** 本藥品須由醫師處方使用。

本藥品不可以皮下注射或肌肉注射方式投予。

每安瓿 5ML，既可靜脈注射也可靜脈輸注。

**靜脈注射：**

成人和青少年一般每日緩慢靜脈注射 1~2 安瓿，嚴重病例每日注射 2~4 安瓿，一天可同時注射兩安瓿的量。

只可使用澄清的溶液。

不可與其他任何注射液混合注射。

**靜脈輸注：**

嚴重病例每天輸注 2~4 安瓿。

嚴禁用電解質溶液（生理氯化鈉溶液、林格溶液等）稀釋。

若要配製靜脈輸液，只能用不含電解質的葡萄糖溶液稀釋，如：5% 葡萄糖溶液。

配製好的溶液在輸注過程中保持澄清，只可使用澄清溶液。

**【不良反應】** 極少數病人可能對本品中所含的苯甲醇產生過敏反應。

**【禁忌】** 由於本品中含有苯甲醇，新生兒和早產兒禁用。

**【注意事項】** 只可使用澄清的溶液。緩慢靜脈注射。製劑中含有苯甲醇（見“不良反應”和“禁忌”）。

**【孕婦及哺乳期婦女用藥】** 參見“用法用量”。

**【兒童用藥】** 新生兒和早產兒禁用，兒童用藥遵醫囑。

**【老年患者用藥】** 參見“用法用量”。

**【藥物相互作用】** 迄今尚未有進行藥物相互作用的研究。本品嚴禁用電解質溶液稀釋（詳見“用法用量”）。

**【貯藏】** 2-8°C 貯存。本品應放置在兒童不能觸及的地方。

**【包裝】** 5 毫升安瓿，100 支以下盒裝。

**【委託者】** 歐舒邁克有限公司 新北市新店區中正路 487-4 號 8 樓

**【製造廠】** 杏林新生製藥股份有限公司 桃園市龍潭區三和里店湖一路 237 號